

En el censo cualitativo debe completarse el listado de especies presentes en la cuadrícula, con la categoría de reproducción de cada especie en caso de ser identificada, con la siguiente clasificación:

## **0. NO REPRODUCCIÓN**

NR - NO REPRODUCTOR O PRESUMIBLEMENTE NO REPRODUCTOR (No se reproduce con seguridad en la cuadrícula o se sospecha que está en migración, es divagante, se encuentra en un área de alimentación, etc.)

## **A. REPRODUCCIÓN POSIBLE**

OB - Especie observada en época reproductora y en posible hábitat de cría

MC - Macho cantando o presente (se oye canto territorial) en época de cría

## **B. REPRODUCCIÓN PROBABLE**

PO - Pareja observada en época y hábitat adecuado de cría

T - Especie observada en aparente comportamiento territorial en dos o más diferentes días en el mismo lugar

CO - Comportamiento de cortejo

PN - Visita a posible nido

AC - Adulto con comportamiento de celo o llamadas de celo

PI - Placa incubatriz observada en adulto en mano

CN - Construcción de nido o excavación de agujeros

## **C. REPRODUCCIÓN SEGURA**

CD - Comportamiento de distracción o defensa de territorio

UN - Nido usado o restos de huevos

P - Pollos recién volados (pollos nidícolas) o muy pequeños (pollos nidífugos)

AN - Adultos en la proximidad de nidos o agujeros que indiquen su ocupación o incubando

AP - Adulto con saco fecal o alimento para pollos

NO - Nido con huevos

NP - Nido con pollos vistos u oídos